

Какво значи да си инфектиран с туберкулоза?


Всеки човек може да се „срещне“ с туберкулозни бактерии и да се инфектира. Когато имаш скрита („спяща“) туберкулозна инфекция, тогава не се чувстваш болен и при нея туберкулозните бактерии могат да живеят в твоето тяло без да те разболяват, а хората около теб не могат да се инфектират. Ако си инфектиран с туберкулоза, ще се нуждаеш от профилактика, за да не развиеш по-късно активна туберкулоза.

Какви оплаквания имаш ако си болен от активна туберкулоза?

Когато отслабне имунната ти система „спящата“ инфекция се активира и започваш да се чувстваш отпаднал и изморен.


Белезите при активна туберкулоза са:

- Постоянна кашлица;
- Болки в гърдите;
- Храчки с кръв;
- Отпадналост и безсилие;
- Нощни изпотявания;
- Треска и повишена температура;
- Загуба на апетит и загуба на тегло.



Как да се изследваш за туберкулоза?

Ако имаш симптоми повече от 3 седмици, трябва да отидеш на лекар. Ако нямаш личен лекар и не се чувстваш добре, тогава се обрни към най-ближкото лечебно заведение за туберкулоза или към центъра за спешна медицинска помощ.



За да се установи дали имаш туберкулозно заболяване трябва да се изследва храчка за туберкулозни бактерии и да се направи рентгенова снимка.

Как трябва да се лекуваш за туберкулоза?

Противотуберкулозните лекарства са тези, с които се унищожават туберкулозните бактерии. Лекарствата трябва да се вземат ежедневно без прекъсване и в продължение на най-малко 6 месеца.

ТУБЕРКУЛОЗАТА СЕ ЛЕКУВА, НО Е НУЖНО ТЪРПЕНИЕ!

1. Ако не се лекуваш или не пиеш редовно лекарствата се развива устойчиви на лекарствата туберкулоза.
Тя се лекува много по-трудно и въпреки лечението, може да завърши фатално.
2. Когато не пиеш предписаните лекарства може да инфектираш и другите. Тогава близките и приятелите ти също трябва да се изследват за туберкулоза.

